

# MUJER CON ANTECEDENTES PERSONALES DE CANCER Y TERAPIA HORMONAL DE LA MENOPAUSIA

## INTRODUCCIÓN

La información que se presenta a continuación está basada en los criterios de elegibilidad de la terapia hormonal de la menopausia (THM) publicados en 2022 que se pueden encontrar en la página de la Asociación española para el estudio de la Menopausia ([www.aem.es](http://www.aem.es)).

Se consideran distintos tipos de categorías de elegibilidad:

1. **Categoría 1:** Ninguna restricción en el uso de THM.
2. **Categoría 2:** Las ventajas superan a los riesgos.
3. **Categoría 3:** Los riesgos, generalmente, superan a los beneficios.
4. **Categoría 4:** No se debe usar la THM.

Fuerza de la recomendación y calidad de la evidencia

DIRECCIÓN	FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN	CALIDAD DE LA EVIDENCIA	
A favor o en contra	Fuerte o débil	ALTA	<b>A</b>
		MODERADA	<b>B</b>
		BAJA	<b>C</b>
		MUY BAJA	<b>D</b>

## **MUJERES CON ANTECEDENTES PERSONALES DE CÁNCER DE MAMA (CM)**

Se considera superviviente de CM a aquella mujer en remisión completa de su tumor que ha finalizado el tratamiento primario (cirugía, radioterapia y/o quimioterapia).

- El riesgo de recurrencia de CM tras una THM oral/transdérmica es bajo

Para supervivientes a CM con receptores hormonales negativos.

### **Categoría 2B**

Para supervivientes a CM con receptores hormonales positivos.

### **Categoría 3D**

- La mortalidad por el uso de la THM en mujeres con CM es baja

### **Categoría 2C**

- El riesgo de recurrencia de un CM tras el uso de tibolona es alto en tumores con receptores estrogénico-positivos

### **Categoría 4A**

- El riesgo de recurrencia de un CM tras el uso de tibolona es bajo en tumores con receptor estrogénico negativo

### **Categoría 2B**

- El riesgo de mortalidad por CM tras el uso de tibolona es bajo

### **Categoría 3B**

## MUJERES PORTADORAS DE BRCA1 O DE BRCA2

- El riesgo de CM en una mujer portadora de mutación patológica del gen BRCA1 que usa THM oral/transdérmica es bajo

### Categoría 2C

- El riesgo de CM en una mujer portadora mutación patológica del gen BRCA2 que usa THM oral/transdérmica es bajo

### Categoría 2D

## MUJERES CON ANTECEDENTES PERSONALES DE CÁNCER DE OVARIO

Las mujeres supervivientes a un cáncer de ovario no avanzado que utilizan THM tienen una mayor supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad y menor tasa de recurrencias que las mujeres supervivientes que no utilizan THM.

### Categoría 1B

**Se debe diferenciar el tipo histológico:** este criterio es válido para las mujeres que padecieron un cáncer de ovario epitelial no seroso o un tumor de células germinales.

Se requiere **precaución** en las mujeres que tuvieron un **tumor de células serosas o de la granulosa**, debido a su dependencia hormonal, recomendándose en ellas opciones no hormonales como terapia inicial.

### Categoría 3D

## MUJERES CON ANTECEDENTES PERSONALES DE CÁNCER DE ENDOMETRIO

Las mujeres supervivientes a un cáncer de endometrio que utilizan THM no tienen una mayor tasa de recurrencias de la enfermedad que aquellas supervivientes que no utilizan THM:

### Categoría 1C

## **MUJERES CON ANTECEDENTES PERSONALES DE CÁNCER DE CÉRVIX**

Las mujeres supervivientes a un cáncer de cérvix que utilizan THM no tienen una mayor tasa de recurrencias de la enfermedad que aquellas supervivientes que no utilizan THM

**Categoría 2C**

## **MUJERES CON ANTECEDENTES PERSONALES DE CÁNCER DE COLO-RECTAL**

Las mujeres supervivientes a un cáncer colorrectal que utilizan THM presentan un menor riesgo de muerte por cualquier causa que aquellas supervivientes que no utilizan THM

**Categoría 1C**

## **MUJERES CON ANTECEDENTES PERSONALES DE CÁNCER DE PULMÓN**

No existe evidencia de que las mujeres supervivientes a un cáncer de pulmón que utilizan THM presenten una supervivencia diferente a las supervivientes que no utilizan THM.

**Categoría 2C**

## **MUJERES CON ANTECEDENTES PERSONALES DE MELANOMA CUTÁNEO**

Las mujeres supervivientes a un melanoma cutáneo que utilizan THM presentan una mayor supervivencia que aquellas supervivientes que no utilizan THM

**Categoría 2C**

**Se aconseja revisar los criterios de elegibilidad de la THM con el oncólogo/a que trata a la mujer.**